

2/

Медицинская безопасность

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты

- ОЧКИ
- ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
- РЕСПИРАТОР
- ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОСТЮМ 1 ТИПА ИЛИ ОДНОРАЗОВЫЙ ХАЛАТ
- БАХИЛЫ



! НАХОДЯСЬ В КВАРТИРЕ БОЛЬНОГО
НЕ СНИМАТЬ РЕСПИРАТОР, ОЧКИ
И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Пациент обязан быть в медицинской маске!

Обрабатывать руки в перчатках дезинфицирующим средством.



Врач должен иметь при себе запас медицинских масок в количестве не менее 20 шт. и предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру.

3/

При осмотре пациента

при наличии у него сочетания 2-х и более признаков

- A. ЧДД ≥ 30
- B. $SpO_2 < 93\%$
- C. $T^o > 38,5^{\circ}C$



ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА **!**
Необходимо вызывать бригаду скорой медицинской помощи по тел. 103

а также при наличии совместно проживающих членов семьи, относящихся к этим группам риска при невозможности их отселения

- D. СТАРШЕ 65 ЛЕТ
- E. НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ФОНЕ ОРВИ
хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, ХОБЛ)
- F. ЖЕНЩИНА БЕРЕМЕННА

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА **!**

Если у пациента:

- A. $T^o < 38,5^{\circ}C$
- B. ЧДД < 30
- C. $SpO_2 \geq 93\%$
- D. ДЫХАНИЕ СВОБОДНОЕ



ПАЦИЕНТ ОСТАЕТСЯ ДОМА

4/

Медицинский работник должен оценить жилищные условия

на предмет организации медицинского ухода, а также готовность пациента и членов семьи соблюдать меры предосторожности для обеспечения изоляции дома

1. ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

в т.ч. общих: кухня, ванная комната



2. ОБРАБОТКА

рук, мытья и дезинфекции посуды, постельного белья и столовых приборов, поверхностей водой с мылом или моющими средствами

3. МИНИМИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК

находящихся в контакте с пациентом дома

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ИЗ ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОТ COVID-19

- беременные женщины
- люди с ослабленным иммунитетом
- люди с хроническими заболеваниями

! ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЙТИ ДРУГОЕ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

находиться в другой комнате или, при отсутствии такой возможности, находиться на расстоянии не менее одного метра от заболевшего

5. НАЛИЧИЕ ЛИЦА, УХАЖИВАЮЩЕГО ЗА БОЛЬНЫМ

идеально, если это будет один человек с крепким здоровьем, без хронических заболеваний или иммунодефицитных состояний

5/

Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома

1 Назначить лечение

- A. ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР 400МГ/100МГ КАЖДЫЕ 12 ЧАСОВ 14 ДНЕЙ

в соответствии с **Приложение № 1**
временных методических рекомендаций ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV)

- B. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. РЕГИДРАТИРУЮЩИЙ РАСТВОР. ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЁ

- C. СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ. ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ПАРАЦЕТАМОЛ

2 Информировать о необходимости вызова врача

поликлиники или скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия по тел. 103

- A. $T^o \geq 38,5^{\circ}C$

- B. ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ

- C. ОДЫШКА

- D. ПОЯВЛЕНИЯ/УСИЛЕНИЕ КАШЛЯ

- E. $SpO_2 < 93\%$



3 Пациент выписывается

- A. ПРИ ОТСУСТВИИ

симптомов заболевания

- B. ПРИ НАЛИЧИИ

двух отрицательных результатов анализов на коронавирус в интервале 48 часов